

表Ⅱ－21 カモシカ被害状況（福井県）

	大野市			上中町		
	被害面積 (ha)	実損面積 (ha)	被害本数 (千本)	被害面積 (ha)	実損面積 (ha)	被害本数 (千本)
昭和63年	5.0	0.5	1	10.0	1.0	1
平成元年	5.0	1.0	3			
平成3年	1.0	0.1	0			

表Ⅱ－21 カモシカ被害状況（滋賀県）

	今津町	朽木村
	被害面積 (ha)	被害面積 (ha)
昭和60年	0	1
昭和61年	0	0
昭和62年	0	15.0
昭和63年	0	15.0
平成元年	3.1	50.0
平成2年	0	4.1
平成3年	30.0	4.0
平成4年	4.2	15.7

表Ⅱ－21 カモシカ被害状況（京都府）

	京都市			綾部市		
	被害面積 (ha)	実損面積 (ha)	被害本数 (千本)	被害面積 (ha)	実損面積 (ha)	被害本数 (千本)
昭和63年						
平成元年	5.0	1.0	2(㍑/㍑)	27.0	2.7	3(㍑/㍑)
平成2年	5.0	1.0	-(㍑/㍑)			
平成3年						

	美山町			京北町		
	被害面積 (ha)	実損面積 (ha)	被害本数 (千本)	被害面積 (ha)	実損面積 (ha)	被害本数 (千本)
昭和63年				40.0	30.0	76(㍑/㍑)
平成元年	40.0	30.0	76(㍑/㍑)	14.0	10.0	26(㍑/㍑)
平成2年	40.0	30.0	76(㍑/㍑)	10.0	7.0	18(㍑/㍑)
平成3年	12.0	6.0	10(㍑/㍑)	7.0	5.0	15(㍑・㍑/㍑)
平成4年	18.0	3.6	11(㍑/㍑)			

表Ⅱ－21 カモシカ被害状況（岐阜県）

	根尾村		春日村		藤橋村	
	被害面積 (ha)	被害額 (千円)	被害面積 (ha)	被害額 (千円)	被害面積 (ha)	被害額 (千円)
昭和52年	0.8	1260				
53年	1.0	1269				
54年	2.1	1374				
55年	8.0	7362				
56年	13.1	12288				
57年	13.7	20390				
58年	0.4	347				
59年	0.03	36	0.02	36		
60年	0.4	402				
61年	2.7	2393	2.2	2751	1.7	1960
62年	0.9	1041				
63年	2.7	2915				
平成元年	12.7	13782				
2年	13.2	14136				
3年	14.0	16536				
4年	15.4	20741				

表Ⅱ-22 根尾村における捕獲個体の性・年齢・妊娠の有無

番号	捕獲年月日	性	年齢	妊娠の有無
1	90. 1. 16	♀	16.5	+
2	90. 1. 16	♂	0.5	
3	90. 1. 16	♂	1.5	
4	90. 1. 17	♂	9.5	
5	90. 1. 17	♂	8.5	
6	90. 1. 17	♀	2.5	-
7	91. 2. 18	♀	14.5	+
8	91. 2. 18	♀	0.5	-
9	91. 2. 20	♂	7.5	
10	91. 2. 20	♂	2.5	
11	91. 2. 27	♂	20.5	
12	91. 2. 27	♀	13.5	+
13	91. 3. 1	♂	17.5	
14	91. 3. 2	♂	9.5	
15	91. 3. 2	♀	2.5	-
16	91. 3. 3	♀	4.5	+
17	92. 2. 17	♀	7.5	+
18	92. 2. 17	♂	0.5	
19	92. 2. 17	♂	3.5	
20	92. 2. 18	♀	1.5	+
21	92. 2. 18	♀	3.5	+
22	92. 2. 19	♀	8.5	+
23	92. 2. 20	♀	9.5	+
24	92. 2. 24	♀	2.5	+
25	92. 2. 24	♂	12.5	
26	92. 2. 27	♂	12.5	
27	93. 2. 16	♀	2.5	+
28	93. 2. 16	♀	4.5	-
29	93. 2. 18	♂	4.5	
30	93. 2. 22	♀	2.5	-
31	93. 2. 22	♂	1.5	
32	93. 2. 24	♀	4.5	+

特別天然記念物カモシカ食害対策測定等調査報告書（1989-1992）より