

V. 引 用 文 献

- 福井県教育委員会, 1982, 特別天然記念物カモシカ緊急調査報告書, 福井県嶺南地方.
pp. 21.
- 岐阜県教育委員会, 1990, 平成元年度 特別天然記念物カモシカ食害対策測定等調査報告書.
16pp.
- 岐阜県教育委員会, 1991, 平成2年度 特別天然記念物カモシカ食害対策測定等調査報告書.
19pp.
- 岐阜県教育委員会, 1992, 平成3年度 特別天然記念物カモシカ食害対策測定等調査報告書.
20pp.
- 岐阜県教育委員会, 1993, 平成4年度 特別天然記念物カモシカ食害対策測定等調査報告書.
22pp.
- 環境庁, 1975, 1976, 自然環境保全調査報告書. ー基礎調査ー
- 環境庁, 1979, ニホンカモシカの分布域, 生息密度, 生息頭数の推定について. 48pp.
- 環境庁, 1982, 第2回自然環境保全基礎調査. ー植生調査ー
- 環境庁, 1983, カモシカ保護管理検討調査報告書. (財)日本野生生物研究センター
- 京都府教育委員会, 1983, 特別天然記念物カモシカ緊急調査報告書. 18pp.
- Maruyama, Naoki and Satoru Nakama, 1983, Block count method for estimating serow populations. Jpn. J. Ecol. 33(3), 243-251.
- 宮脇昭, 1984, 日本植生誌『中部』, 至文堂. 604pp.
- 宮脇昭, 1984, 日本植生誌『近畿』, 至文堂. 596pp.
- Morishita, Masaaki, 1959, Measuring of interspecific association and similarity between communities, Mem. Fac. Sci. Kyushu Univ., ser. E(Biol), 65-80.
- 森下正明・村上興正, 1970, ニホンカモシカの生態的研究. 白山の自然. 石川県.
276-321.
- 農林水産省統計情報部, 1981, 1980年世界農林業センサス, 福井県統計書(林業編).
147pp.
- 農林水産省統計情報部, 1991, 1990年世界農林業センサス, 福井県統計書(林業編).
147pp.
- 農林水産省統計情報部, 1981, 1980年世界農林業センサス, 岐阜県統計書(林業編).
311pp.
- 農林水産省統計情報部, 1991, 1990年世界農林業センサス, 岐阜県統計書(林業編).
331pp.
- 農林水産省統計情報部, 1981, 1980年世界農林業センサス, 滋賀県統計書(林業編).
207pp.
- 農林水産省統計情報部, 1991, 1990年世界農林業センサス, 滋賀県統計書(林業編).

213pp.

農林水産省統計情報部, 1981, 1980年世界農林業センサス, 京都府統計書(林業編).

207pp.

農林水産省統計情報部, 1991, 1990年世界農林業センサス, 京都府統計書(林業編).

213pp.


滋賀県教育委員会・(財)日本野生生物研究センター, 1983, 特別天然記念物カモシカ緊急調査報告書, 湖西山地の場合. 17pp.

滋賀県教育委員会・(財)日本野生生物研究センター, 1984, 特別天然記念物カモシカ緊急調査報告書, 滋賀県におけるカモシカの密度分布, 野坂・伊吹山地の場合.

20pp.

Tokida, Kunihiro and H.Ikeda, 1988, Present status of Japanese serow (*Capriornis crispus*): Distribution and density. カモシカの生態と保護に関する基礎的研究. 昭和62年度科学研究費補助金特定研究(I) 研究成果報告書, 3-10.

資料1 カモシカ保護地域の位置



資料 2 保護地域の名称と面積

No.	保護地域名	面 積 (ha)	面積比(%)		関 係 都 道 府 県
			民有林	国有林	
1	下北半島	33,397.00	0.0	100.0	青森
2	北奥羽山系	104,310.87	2.1	97.9	青森, 秋田, 岩手
3	北上	41,167.87	41.4	58.6	岩手
4	南奥羽山系	57,663.75	6.2	98.3	秋田, 岩手, 山形, 宮城
5	朝日・飯豊山系	122,681.51	4.9	95.1	山形, 福島, 新潟
6	越後・日光・三国	218,004.83	19.8	80.2	新潟, 長野, 群馬, 栃木, 福島
7	関東山地	76,459.95	80.2	19.8	東京, 埼玉, 群馬, 長野, 山梨
8	南アルプス	121,984.67	71.0	29.0	長野, 静岡, 山梨,
9	北アルプス	195,569.32	6.1	93.9	富山, 岐阜, 長野, 新潟
10	白山	53,661.99	31.5	68.5	岐阜, 福井, 石川, 富山
11	鈴鹿	14,251.30	89.3	10.7	三重, 滋賀
12	伊吹・比良山地	78,338.12	79.2	20.8	福井, 岐阜, 滋賀, 京都
13	紀伊山地	79,512.30	65.9	34.1	三重, 奈良, 和歌山
14	四国山地（設定中）				徳島, 高知
15	九州山地（設定中）				大分, 熊本, 宮崎

資料3 カモシカ生息密度調査地の林相図

生息密度調査地の番号、位置は表Ⅱ-17、図Ⅱ-21に一致する。図中の太線は生息密度調査地の範囲を示す。

<凡 例>


強度の地表改変地



弱度の地表改変地




耕作地



牧場

自然裸地



林業利用地



スギ・ヒノキ林(鬱閉)



スギ・ヒノキ林(鬱閉せず)



アカマツ林(鬱閉)




アカマツ林(鬱閉せず)



カラマツ林(鬱閉)



カラマツ林(鬱閉せず)



伐採跡地・幻齢林

草原



自然林



針葉樹自然林




針葉樹主体の針広混交林
(針葉樹70~50%)






広葉樹主体の針広混交林
(広葉樹70~50%)




広葉樹林






No. 1 伊勢川（福井県和泉村）






No. 2 笹生川（福井県大野市）










No. 3 白谷（福井県大野市）




No. 4 倉の又山（福井県大野市）




No. 5 田代 (福井県池田町)





No. 6 田倉俣 (福井県今庄町)





No. 7 夜叉ヶ池 (福井県今庄町)



No. 8 雨谷 (福井県敦賀市)



No. 9 新庄奥 (福井県美浜町)



No.10 能登又谷 (福井県美浜町)